庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百五十四

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官太醫院院使臣張華基

校對官中書臣范來宗 總校官中書臣朱 鈴 **腾銀監生臣左熙世**

是蠱毒粗醫以斷痢藥處之此大非也 爛鷄肝〇又云凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆 中之者心腹惧痛煩毒不可忍食人五臟下瘀血黑如 火門日日日日日 盤能變化毒害人有事之以毒害多為飲食內行之 普濟方卷二百五十三 諸毒門 盤毒下血附論 普済方 周王朱橚 撰

金石中月百里 躅散 血物生葱狸肉 右搖為散水一两蓋不知加 茜根 羊躑躅 敖 野葛皮 方 治中蠱下血如申肝腹中疗痛急者 治蟲毒腹痛注下赤血 乾薑 肉桂 教蘆 附子 难黄 四豆 卷二百五十二 丹砂 地榆 栗米忌猪肉蘆 蜈蚣炎各 桔梗 啊

火下日日日 红地 治中蠱下血日數十行者方 内下部中日三瘥 即治食人五臟乃死 右為末別治巴豆合篩和相得以錦裹藥如大豆許 右粗篩每服五錢以水半盛煎之分去滓不拘時服 巴豆松二光青 教蘆 治蠱毒下血爛內片心腹污痛如有物醫不 普瀬方 各五錢 附子 巻石かる

治蟲下血欲死方 金欠巴屋台電 諸蠱並出 右先以水五盛者、槲皮桃根皮取濃汁 汁每服煖汁 食旦服須臾用水一盛用鷄翎引吐於中如牛涎 啊 人與陰桃根白皮 麻子汁 根升到 一盛調頭髮灰蝟皮灰二錢服今患 牛膝班連翹 , 五升 卷二 並細 各四 剉 蝟皮灰 蝉子大 二盛和麻子 亂頭髮

たこのほから 治蠱吐下血
す 中盤毒下血肝 右叹咀以水二升煮取一升類服即下盡一方以 右研 酒共煎服亦得 石切以水四升煮三升分三服不計時 范麻 櫸 細木 長七尺蘆荻根五寸如足 去一皮粒 朴硝 服新汲水調 餃 普濟方 下連作二三服效 微指 根大

桔梗散 金吳口戶自書 地 偷散 損 樂幹開口准之心中自定服七日止食諸雅脯補之 物 右搖羅為散每服以温酒下二錢每日三服不能 加 者用 桔 煩渇 一方單用桔梗搖屑酒服一方搖汁服並瘥 梗 治卒中蠱毒下血如鷄肝晝夜不止脈腑悉 頭伏龍肝分等 治蟲毒下血或腹痛或不痛百治不效日 卷二百五十三 夜 下

次已可見全替 皷皮散出直出治盡毒下血如鷄肝晝夜不絕臟腑敗 牛膝酒出十二治腸盡先下赤後下 腹服之再服便愈 用牛膝 石為細末熟米飲調下一錢 用皷皮五寸 壞待死而已者 椿根東引根白皮地輸各五 两槌散切以淳清酒一升清一宿平旦空 一薔薇五寸酒水煎服 普濟方

治中 告瓠湯思方的治蟲毒吐血或下血如爛肝 金欠口后 用蜩 瓠蘆 温服二服吐下蟲即愈范注方云苦瓠毒當臨時 用苦瓠一 '肘後方云用苦酒一升煮令温服之神驗一名苦 盡毒為血日夜無度腹痛不可恐者後方 惠方尚治蟲毒下血 枚炒為灰細研以熟水調下二錢日三服 枚切以水二大盛煎去滓以取 卷二百五十三 一盏空腹

いいで四車全書 瘥 荷葉四五枚放病人床席下勿令病人知若中毒則 中午時漬叉以新白布三尺盖上布上刀裂一横口 亦不勞深勿取針當自服或吐或痢去根先取白蘘 服如人行十里再服若不肯服可針两手大指端甲 正對病人眠林下安之明日午時樂用布濾去分三 取皂角三箇多去皮子打碎歐醋四升入瓷器中日 不眠其上矣一方治蟲毒以清酒一宿去浑垣服並 告酒方

治蠱毒暴下 療卒中盤下血如鶏肝者或晝夜出血石餘四臟皆 開灌之心中當須與自定服七日止當猪肝膽以補 惟心未毀或鼻破待死者 以桔梗搗屑酒服方寸日三服不能下樂以物挖 以筋子根酒飲磨服 盡毒下血如鶏 肝或晝夜不絕臟腑敗壞待 卷二百五十三 次已日日公門 治蠱毒下血如鷄肝或出血石餘四臟虚惟心未毀或 治盤毒血痢方見中盤 取馬蘭根末水服七寸下隨吐出極神效苗似葛 鼻破待死 毒一方作飲服 姓名令鹽主呼取鹽姓名即蹇聖惠方亦治小兒蟲 取敗鼓皮燒灰作末酒服方寸下須臾自當吐蠱主 避姓名方 普瀬方

金片里屋台電 偅 盡毒溪惡刺虎狼蟲虺等毒 緑子生子如橘子 病源云盤是合聚五之類以器四盛之任其相歌 右二味不拘多少煮汁服之若研服又良 存者名為盤能害人 胎主 乾犀根馬二三 **加黑色亦如細文**工商土者根大 蠱毒吐血 附論 辛如 獨並根如細辛嬰婺洪饒間首 卷二百五十三 食 金藤味苦 地平

次での東ムと 太上五蠱九一名雄黃九高治百蟲吐血傷中心腹結 不治之食臟腑盡則死矣 醫或類面目青黃病變無常是先傷於膈上則吐血也 氣堅塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上 界成着林不起悉主治之 與鬼交狐狸作魅卒得心痛又胸脇痛如刀刺經年 氣去来無常狀如鬼祟身體浮腫心問煩痛寒戰夢 普濟方

日将息服一劑三十年百病盡除忌食五辛一方 九以下痢為度當下蟲種種状貌不可具述下後每 石樂為末煉塞和更搖二千杵九如小豆先食飲 具珠巴豆有木香空心粥飲下亦以痢為度 香思回 雄黄 枚班猫 粒 九家封勿泄樂氣十九為劑如不中病後日增 椒目 裝石 巴豆 教蘆分門子分類肝分與松 卷二百五十三 **莽草** 光花

次至四重全書 !! 治中蠱吐血方 右吹咀 以水七升煎取二升分三服 思猪肉冷水 万加犀角升麻各三两無蘘荷根用茜根四两代之 鄡 粒 两 惠方尚治中盡吐血 放皮亦住 伏龍肝錢 狗肝如東班街去翅 後方以及下血出肘以及下血 败 普済方 一两當 足 四糕

治中 金灰巴尼人 時服 尚根湯 思 为 尚治中 蟆及蛇等出為驗 石粗搖篩分為四服每以水一盛煎七分去滓 石搖羅為散每服二錢空心服以酪漿調下 盡吐血後 雄黄婦丹砂 方 肘 盡毒吐血 卷二百五十三 敗鼓皮燒存性 两 分 或吐蝦

欽定四車全書 具 茜根湯金ガ岩治蠱毒吐或下血如爛肝亦治肺疾 獨效散血行尚治諸熱毒或盡毒鼻中及口中出血方 右搖篩為散旦以井花水服刀圭當吐鹽毒忌生物 即愈又自當呼盡主姓名茜根草即孫鋒草也 右細剉以水五盛煎至三盛半去滓空腹分温三 血狸肉一方無椎黄 取人尿七枚燒作火色置水中研之類服即愈亦解 茜根 裝荷根 日本 普済が 服

桔梗汁患好尚治中盡吐血及下血如鷄肝晝夜不絕 麥麵散 忠か 岩治中毒吐血 治食着諸毒肉吐下血不止痿黄方 下即瘥 用生桔梗不拘多少捣取汁每服 臟腑敗壊 用小麥麵二合分為三服以冷水調服半日服盡盡 百毒時氣熱病之毒服記温覆取汗為度 卷二百五十三 小選日三服

钦主四東台馬 一 治中蠱毒吐血或下血皆如爛肝者 治 治中盡心痛吐血欲死方進力 用蚯蚓十四條以苦酒三升清之射死但服其汁口 夜二服即止 用益一升醇苦酒一升者令和一盡服立吐即愈 死者皆可活 取净胡妥子 盡毒或吐下血如爛肝 升煮食使破取汁停冷服半升 普濟方

叉方 痒不痛人罕自覺若不即治則便膿虫毒上食五臟 喜睡朝輕暮劇手足指冷二三日則虫生下部生瘡不 疼心煩懊悶四肢振掀腰背骨節皆强或偷發熱神昏 用蝟皮燒存性為末水服方寸下當吐鹽毒 用蟊實日乾搖為細末每服方寸以水調下隨吐效 水毒其名有三中溪中灑中水其状惡寒頭痛目 中水毒門論 1. 111 卷二百五十三 次已日年七年 為多陰瘴氣為多陽多陽則熱結於中多陰則指節逆 治尤不可忽凡水毒惟高山及山峽溪源繚繞處多有 陽毒也其脉緩大而数其瘡如鯉魚齒者陰毒也其脉 沉細而運陽毒雖急而易治治宜發汗陰毒雖緩而難 盛煩毒注下不禁八九日死若手足指冷至一寸為微 有毒亦猶廣南山高地下氣不疏通故鬱而為瘴水毒 之何者山高水冷日中始得陽氣故得陰氣常積而水 至肘膝為劇然治水毒有陰有陽其瘡正亦如截內者 普濟方

與射工相似 **到蒜四升搖碎內湯浑洗浴若身體發赤班者是水** 冷二者為病大體與傷寒相類欲辨水毒即以熟湯 麻湯 此症劇則為洞痢及齒間出血心腹煩滿下血如爛 不食而在皆為熱毒變化而成也土人辟都之法畧 西龍 腦 治中毒寒熱 菱鞋 卷二百五十三

葱白湯 烏梅湯 温服移時又服 用烏梅三两去核熬搖碎每服三錢以水 右對如麻豆大每服四錢以水二鍾煎至一鍾去 服未蹇頻服 石粗搗篩每服五錢以水 葱白一握或半葛根二升麻三分 治中水毒手足指俱冷 治中水毒溪毒如傷寒状 鍾半前至八分去率温 盏煎七

次色の見らい

普濟方

金厂区屋石量 五加皮散馬方點治中水毒溪毒寒熱如傷寒状 旦三服 用牡丹皮二两搖羅為散每服二錢以酒一盛調 用五加皮三两洗切搖羅為散每服一錢以酒 調下日三夜 為末水調服 滓不拘時候頻服之 出聖 治中水毒溪毒 粥飲調下亦得一方以五加根燒研 卷二百五十三 下部垂蝕生瘡

次已日日在十二 治中水毒 治中水毒手足指冷即是或至膝肘 葛藤洗び 搖藍青汁以少水和傅頭面身上令西 下部良 用葛藤不拘多少以水煮取濃汁洗下部并導灌 手足指冷即是若暖非其冷或一寸極或竟指未過 以浮萍日乾為末每服三四錢以酒服又云中水 治中水毒溪毒下部虫蝕生瘡 普源方 病

金万四周五書 治溪毒 治水毒中人一名中溪一名中濕一名水病似射工而 治中水毒 塒 射工 以馬齒寬紋汁一升以深傳瘡上住日四五遍方治 用森禁 無物 毒 寸淺至於肘膝為劇 把熟指杵以酒一盛攪服之不過三服愈 卷二百五十三

次足四戶 LE 又方 治病中水毒方 汁日過三即愈 用常思草搖絞汁三升并以綿裹中指以導下部飲 取梅葉挑葉搖紋汁三升許以少水解為飲之 澤適寒温以浴若身體發赤班文者無異 不能飲以汁傳乳頭與之 小蒜三升吹咀於湯中莫令大熟熟即無力擔 普濟方

又方 又方 金グログと言 以烏蒜一枚爛搖酒半盛和服獲一名烏韭山中甚多 据着耳取汁一大 選分二服 以燒鮫魚皮水調下二錢 腰背諸處即蹇七姑生冬問細樂如酸黃 卷二百五十三

又方 又方 次足四車全書 ~ 牛膝莖紫白者是雌 取募搖汁一盏漸飲魚以塗身令周匝立蹇用酒調 取雄牛膝一把水酒共一盛清絞取汁飲之日三雄 用大海根捣末飲之并導下部生者用汁夏月行當 工凡洗浴以少許投水盆中即無復中毒也 多實此樂末入水以一錢投水上流無所畏又辟射 普湾方

治水箭有二種 指或半錢大如真紅色起泡子疼痛不可恐即有線 色赤初發不痛不痒中間微白其赤處如虱咬不 右用蛇每草一撮帶嫩根及梗連葉五六十片净 則便起白泡疼痛不可忍有線一道入腹則殺人 直衝上肚便能殺人 緩於赤箭者耳大思抓破風水入內則不治 研入酒隨人所飲多少不得過半碗酒浸半時 一種亦箭發則甚速或在手足肢或 卷二百五十三 種白箭生處大小皆不定 顔 但

熏蒸胺臟令人志亂乃至不醒有連日而無所覺知者 大巴四日台台 世嗜之無節或飲過度停積不散為滞於胃散流諸脉 出能通関節而走膚腠上古作湯液醪醴為而不用後 夫 炒記塗患處以帛縛定半日便退大抵須治於未 酒者熟穀之液也其性慓悍急疾後食而入先食而 出草滓暖温此酒服了以前滓入些塩拌於五上 √前則易切慎切慎 解酒毒門論 普濟方 1 一台 痛

金分 當風席地及水洗飲水交接之事〇有人飲酒過多因 俱陽乃無形之物傷之當發汗則愈其次利小便而消 甚則中毒而為酒追諸執之病也酒者大執有毒氣味 是也〇又云凡醉不得安卧不動使人摇轉不住時忌 **共濕則分解之矣今酒客多服大寒大熱之劑下之** 酒作病胸脱不快其氣捫隅服無數二陳湯竟無寸 云酒疸下之久為黑疸慎不可犯盖令上下消分其蘊 無形元氣受傷而有形陰血亦損垂誤甚矣金匱要略 E 卷二百五十二 則

焦使然耳又有人酷好飲酒復感寒邪服不換金正氣 荷煎雞顏九麻仁九日就痊愈乃以胸院問開熟在 溢經絡使血脉充湍令人 由是不喜飲食復以調氣服之致發大熱自後只用薄 次定四華全村 寬中芍藥調榮止汗頻然痊愈然則酒家抱病其可妄 以温樂嘗試一中乎〇凡飲酒過多酒毒漬於腸胃流 以致内熱愈熾煩渴且問汗出如雨身體怯寒續後 小柴胡湯加枳殼白芍藥解之柴胡黄芩退熱枳殼 普濟方 煩亂嘔吐無度乃至累日不

金欠日 而生病馬病症非一故云諸病也 惡寒有同温瘧或吐痢不安或嘔逆煩悶隨臟氣虚實 絡清臟腑而生諸病也或煩毒壮熱而似傷寒或洒浙 散故也人有荣衛否溢痰水停積者因復飲酒不至大 醒往往有腹背穿者是酒熟毒氣所為故飲酒須搖其 醉大吐故酒與疾相搏不能消散故令腹湍不消也〇 、酒性有毒而復大熟飲之過多故毒熟之氣渗溢經 以消散也〇夫酒性有毒人飲之有不醒隨血脉流 Ŀ 1. THE 卷二百五

こうり 香附子町 沉香 A date : 幾白豆落仁 日 檀香四三 两四 普濟方 口氣助脾胃和飲 加南硼砂 两

金万口匠 右為末煉塞為九如龍眼大每服 否塞手 花解酲湯 炙 乾薑 用炒 足戰搖飲食減少小 治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩 箇 四 卷二百五十三 一流香 枳實 便 浸煮 二 十 一穗 分豆 拔出 枚 粹濟 湯 扨 生 泡 作 片 × 陷 ኧ 次 汁 用

火产习更合言 沉檀快購九 酒病去矣此盖不得已而用盖藥味辛 不損元氣敵酒故耳不可類服恐損天年 口吐酸水 石為極細末秤与每服三錢以白湯調下但得微 香附子介 錢猪苓錢五分 五分青皮 生堂尚治酒食所傷胸膈痞悶氣逆吐痰出德 丁皮平甘草广桂枝 三錢草生薑錢人去粮乾上 麴錢炒二 普濟方 五釐

金灰巴尼人 和湯 色和匀加前樂末為九如桐子大每服五七九細 酒水任下無時加數九亦可 右為末用砂仁杵碎取仁作母炒豆粉一斤四两首 益智仁 香門加山果子四两 治飲酒煩渴 霍香 檀香 砂仁 厚朴 杏仁 两各四 白扁豆 藿香 甘草 当時あるこ

Caldia Litia 醉且無疾 石為細末煉 吹咀用生薑三片棗子一枚水煎服 橘皮 甘草錢二茴香 箇 核粹 嵩治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑将出濟生 人去的木香 生畫沒一兩腌一夜焙乾 不進日漸肌瘦如飲酒先服此樂百杯 京三稜蛇三砂仁 普濟方 乾薑馬白 两作五丸生 ラミナ 自 香五十 白豆蔻

金年四月生書 細嚼用白湯下 可增酒味以津化 消痰並治中酒不散細嚼一 錢五 華澄 治 橙皮 細嚼無時 ·味為細末用甘草膏和作餅子每服二 院方 為治温脾益胃降氣寬中生津液止煩出神樂 白豆蔻两 木香 化自逼人香 方用益智仁二十箇 沉香錢 龍腦或薑黃四 卷二百五十三 橘紅 解用酒下或沉至面 白檀 两 廿 細

次乞四東全書 國 百杯九此如樂尚治酒不散胸膈滞問嘔吐酸水心腹 温服不拘時候一方無葛根 右判如麻豆大每服三錢以水一盛煎至七分去滓 勞酒入百脉令人恍惚失常 痛並服之 洗甘草沒葛根 参門与樂 姜實 とおっち治飲酒過多大熟煩躁言語錯謬及房 酸聚仁两一 普湾方 枳實去粮於神太生地黄 3

木香分氣力 金ダロ屋と言 得效 右九味為末煉蜜和成劑每两作二十九每服 香附子上三稜 砂仁 沉香切紅豆 甘草厅豆粉并两炒薑黄豆 五錢白豆蔻 一萬湯送下不拘時候 生堂治酒食後胸湍氣痞宜常服之本方 乾葛 两乾生薑海 卷二百五十三 二两 啊 あり 一天 我各 ρIJ 檀香

次已以自己等一 訶梨勒散出聖尚治飲酒後痰滞心膈不利腹脇脹 豆蔻丸馬方尚治飲酒太過心問腹滿吐逆喘急 右粗搖篩每服三錢以水一盛入生薑一分煎七 去滓不拘時温服 石為細末砂仁四两杵碎取仁作母水為九如鷄頭 八每服三五九細嚼酒水任下無時加服 草豆蔻去皮下 当)出聖. 檳榔 二分丁香 陳皮治去白焙 善濟方 小豆 木香 Ī 髙良

高良 金欠世月月十 頭疼心悶 石粗搖為散每服三錢以水 髙良 (薑散患が常治飲酒後即虚心胸脹淌 越桂心或甘草 做赤 訶梨勒皮 微服細叩之 剉 二两 蘇獎陳皮 去白旗湯 卷二百五十二 五銭人 木香研 一鍾 一卷三次白术 入生薑五種前至 錢桔梗 分 术疑沉香 錢克木

次足可其心馬一門 五豆湯生堂尚能解酒毒止煩渴能發小兒痘疹不 拘時温服 右用水五斗五升臈八日用大鍋熬至豆熟為 右搖為散每服三錢以水一 去豆汁類冷以大磁瓷盛之用苦葉紙重封春夏 解發渴之症後成瘡痍者 黑豆 下甘草下 貫衆打 黄豆 菜豆 人俱不 普湾方 青豆 中盛煎至六分去浑 赤小豆 立 并各 五 草

金万口屋石雪 右㕮咀以水一斗煮取三升分三服一方茯神作 熬飲酒下以酒入百脉心氣虚令人錯謬失常 参飲出す尚治飲酒房勞虚受熱積日不食四月中 開用酒後渴隨意飲之小兒痘瘡不出飲即發見 家不可不於贈月八日留心敖之此藥水浸服 生地黄八酸棗仁并换神三白散 **芍薬** 括婁根 卷二百五十三 枳實 知母的一甘

益智子散患方為治飲酒過多肚腹脹淌不消心下 大巴马甲白雪 急妨悶 石搖羅粗散每服一錢水一中盛入生薑五釐煎 分去滓微温呷之 益智子去水砂仁 分 起木瓜分陳皮五錢湯浸 香錢砂仁 治酒食後胸膈痞悶 兩檀香兩甘松兩白豆蔻點畫苗 普済方

金分四周白言 全真丸 石為細末用甘草汁為九每一两作十九細嚼熟 石為細末用米醋打糊為丸如桐子大每服三五十 食後温湯送下日進三服 皂角文武火炙黄色 黑牽牛頭末馬上 甘草 治男婦酒食過傷胸膈痞悶 到 刑 黄通南木香與陳皮五甘首 卷二百五十三 用

火足四年红台 草豆蔻散馬方高治飲酒過度嘔逆不止心腹脹淌 解酒藥 右吹咀如麻子大每用少許細嚼解酒立效 分去浑點少塩攪匀服之 石搖為散每服三錢以水一中盛入生薑五釐煎六 皮震为去白 葛根 草豆蔻士皮高良薑三分 薄荷 砂仁 普濟方 甘草谷五 人祭五錢白茯苓而青 盆硝五分

橘皮湯 金厂口厅 水服此 右粗搗篩每服三錢以水一盛煎至七分去滓温服 右為粗末水煎三五錢去滓服 不拘時服之 甘草 陳皮去白湯萬根對草到石膏一两 治飲酒過度酒毒積在腸胃或嘔吐不食湯 解酒毒 乾葛花 萬根 卷二百五十三 砂仁 貫銀各等

解酒毒 百杯散 次足四軍と自一人 石膏湯 温服不拘時候 右剉如麻豆大每服五錢以水二盛煎至一盛去滓 石為細末小粉糊為九如桐子大温白湯下二十九 石膏西葛根對生薑無切各 百樂煎 治停酒胸膈痞悶飲食不快但是一切酒 治飲酒過多大醉不醒 治飲酒太過 乾葛 枸杞子 普湾方 丢

麻仁丸 治酒病方 五次口屋台電 宜服之 右以水四升煮取二升損服 右為細末每服一 万愈未知再服忌食甘草藥物一二日 您白 甘遂 治連日飲酒咽喉爛舌生瘡 豉 橘皮去葛花净 升各 一錢用温酒計調服至夜痢下酒病 卷二百五十三 两

火色日日日 日日 治因為酒毒所傷斷酒方 五靈脂丸 右研勻飯丸如小豆大每服十九米飲下不拘時 右為末蜜和丸含之一方用黄蘗二两 右都盛於瓶中密封瓶口安在猪圈內任猪摇動經 五靈脂 酒升味砂五錢 為末麝香少許 二两肘後 作黄藥 普濟方 研 ギ

治飲酒中毒不醒方 金石口屋石潭 治飲酒過度欲至穿腸 拘時候温服之立吐即愈 用大豆三升以水三升煮取二升去滓每服一 七日取之飲盡為度 取騙蹄硬處削下以水濃煮汁 酒醉不得安即必須使人 展動不治恐酒毒腐 一盏不

柑皮煎散 大三日 巨八十二 治飲酒中毒方 用乾桑椹二合以酒 盞 煎三五沸温服或入蓝心 用柑子皮二两洗焙乾据羅為散每服三錢以水 傷胃宜急治之 即解 以生郊根搗取絞汁每服 治酒毒昏悶煩渴或醉不醒 普濟方 升浸一時人取酒漸漸飲 小盛頻服力 許沸湯點未效再服


金灯四月日言 治酒醉醒方 葛根湯 煎服 用葛根細判二两粗搖篩每服三錢以水 用葛花 用菘菜子不拘多少每研半合以井花水 治飲酒中毒 治飲酒過不醒 两搖為末沸湯點 卷二百五十三 方葛根汁一斗二升取醒 盏調服 盛煎七

沙足口車 私野 治 治飲 治飲酒頭痛方 酒毒下血方 用竹茹五两以水八升煮取五升去滓今冷內破 用乾蔓青根不拘多少蒸三次切焙乾為散每服 錢以飲酒後用新汲水調下一方煮汁內難子清三 清五枚攪匀更煮二 酒腹滿不消方 解酒類 方見本門 普濟方 一升盡蹇 芜 雞

治飲 治消毒明目散氣滿不能食 解 用百樂煎二两 取赤小豆花煮服之又下 取旅根雜鄉魚為養服之 酒毒開胃口方 錢陳米飲調下 湯煮大器中漬之復易之酒自消夏月用之佳 酒大野恐爛腸方針千 1.1 mm 两燒存性一兩炒香為細末每服 卷二 百五十三 水氣大治飲酒不醉

活飲 治飲酒大 方 右用白粳米 用枳椇子 一百年の一百万 惠出 方聖 公滓温服 ,醉中 两到每服 出聖 恵方 普濟方 两以水 発清が住 手

金万匹人 治飲酒連日醉不醒惠方 括婁湯 右粗搖篩每服三錢以水 取雞了 取石二三枚漸至盡驗 不拘時候 蕪青菜并小米熟者去浑冷內雞子三枚調勺 枯婁根錢麥門冬去心焙 白重 治飲酒發渴又欲飲酒 人枚苦酒漬っ 卷二百五十三 器中室封内井底 一盏煎至七分去滓温 葛根 桑根白皮 宿當財 服 切两



專治吐酒過用方 金月口匠人 等湯不解者可服 右切以水三升煎取二升服之即解 碗煎至七分臨睡通服 若已服安和樂仍不退者此小觸動服然該 地榆 治酒太過眼執口瘡去痰 加皮 卷二百五十三

解酒渴 解丹毒 次にの見という 解酒毒目黃者 温水送下 右各等分為末糊為丸桐子大每服六七十九臨睡 南星 枳實 明煮食之 門後順執所諸毒類 陳皮 半夏 出本 草 青皮 普漸方 黄茶半大黄用 桑皮 Ē

金万世屋 欲 葛根 用葛花并小豆花末子為散服二三服即不醉 用 1 醉則不損 好松菜二斤者作美吸之作虀強亦得 將酒毒 胡麻亦煞酒先食塩 护) E) 多少 淘 水 卷二百五十二 以雞子煮乾浦麻 一撮後 飲調 丁服使 便 用

大江日日日上山北日 治酒毒 草節散草本 蘇汁九出本尚治酒食所傷并敢 汁下臨卧服小兒一丸如酒積温酒下 右件一處研成膏丸如黄米大每服三五九淡贅湯 石為細末每服二錢米飲調下 杏仁首巴豆皮枝 碌砂飛净 亦馬其中草即不拘多少 食柑子而蹇即抽也口喻雜舌香即丁子 普濟方

金万四厘百量 酒毒肺熱咳紅四黄湯九出本 沈香亦可祛口中如膠而臭出 含之吐棄厕下即瘥 石件略為末蜜九冷噙 石樂煎湯入塩噙早起汉井水第一汉水 甘草分等 和母 宣連 地骨皮 大黄 山梔子 桑白皮 卷二百五十三 出 黄芩 山梔子 麥門

火己の見 謂之 煎枳根子湯送下明日再服以不渴為度枳椇子亦 消渴此樂主之 多状似鸦渴大抵消中之疾往往脾氣衰元氣耗散 右件研細以好酒濡之為九如菉豆大每服一十 土不制水故水益不收冷脾有熱而元氣不衰者非 麝香 一願漢指頭盖取其似也小兜喜食之食前服 OFF DE 當門子 尚治飲酒消多及傷瓜果虚熟在**即飲** 普済方

金万旦月百量 大酒不可安卧 天南星九年 房事 中次用剛灰於窟内簇起燒過大半除火去灰合净 以煮酒一 右於平地上掘一窟濶五寸深一尺五寸仍略搗 常今搖動轉側又當風席地及水洗飲水最思交 南星二斤端 自 能去痰治酒積化酒毒 正者 一斗澆之将南星於其中覆以瓦盆用元土 草 出 卷二百五十三

解酒毒出本 治職氣嘔逆車 次足四百合 許 用糟寫中酒以小兒乳和少牛 九如桐子大又以硃砂為衣每服五十九至百九生 **틜湯下不拘時** 和洗切作片焙乾研末入雅過辰砂一两薑汁糊為 泥封固盆維勿令透氣 出本 普濟方 一宿早取出用酒水各二 乳飲之亦可單服 Ī

治嗜酒不已 金牙口匠人言 酒毒草 酒毒目黄出本 取益麩子乾据為末食之 以蚬肉浸取汁服一方煮食之 取葛根茶食之 節則毒人至死 山蛩虫一節燒為灰水下服之訖便不 出本 · 草出 本 一其粉甚妙一方搖汁飲三升即醒 卷二百五十三) 規子 溪澗皆 (左) 冇 湖 邉


治嗜酒方 治醒河止渴除痰吐去酒毒酒毒四黄湯丸 治斷酒方出す 次已日東人生 治酒岩唾 則不效 右等分為末黃昏時酒服 以種菜耳子七枚燒作灰投酒中飲之勿令人知知 臘月鼠頭灰 音涛方 一盃一 方水調三錢


益脾丸 鱼为口屋台量 用菱雞葉為散服之愈 酒後睡服之得愈 右為末酒水各一碗熬成膏蒸餅為九如桐子-酒不醉方 酒時酒送下二九 白扁豆五粒乾葛 院方 岩的飲酒不醉又益脾胃 治飲酒不醉以後四味 两菜豆花錢木香一分 卷二百五十三 益智 昔晋嵇紹有胸中寒痰 縮砂仁 各等

又方出方 飲定四車全島 人 治飲酒令人不醉方出千 右治飲前為 右為末服三方寸臨飲時仍進萬根汁及枇杷葉飲 **夜飲津液下五丸不醉大妙** 石為細末白蜜為九如桐子大煎紅花湯下十九或 葛花 柏子仁 麻子仁为二 小豆花分等 一服進酒三倍 普洛方

叉方 白ケロ屋とする **乾蒲煎服亦佳** 並能倍酒又搖生葛根汁及葛藤餅和統汁飲 取九月九日菊花為末臨飲服方寸亦治酒醉不醒 五月五日取井中倒生草枝陰乾為末酒服之二 六月六日取小豆花葉陰乾百日為末服之 金出方干 卷二百五十三

遇仙方 治飲酒令無酒氣方出五 詩曰丁香沉檀麝 でして だれる 二 酒者水穀之精 **投壺内席上** 服之神驗 右用乾蔓青根三七枚三遍蒸為末二錢許酒後 惡酒 門論 春風正遇仙 錢更無香附五分先飲時 哲濟方 勝胃則勝 五






又
方 义方 金万四月石量 用白猪乳汁一升飲之永不飲酒 病 刮馬汗和酒與飲終身不飲 用故檀中菜耳子七枚焼灰黄昏時服 人狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也 卷二百五十三 盃咒曰與

叉方 大司司巨公馬 又方 又方 取虎屎中骨焼末和酒與飲 取鷹毛用水煮去毛頻服 取鸕鷀屎焼灰水服方寸其效如神 以故車絃焼灰和酒與服 普濟方

又方 金灰口匠台潭 又方 用酒漬汗靴替一宿平旦空腹與飲即吐不喜見 用酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之 以自死齊轉乾搖末和酒與飲即嘔神驗 取驢駒衣焼灰酒飲方寸妙 卷二百五十三

叉方 次三四年在野 又方 酒病方 治惡酒嗔怒不醒方 用腦月馬腦和酒服之 用廿蔗搖取汁每服一小盏 用雞子清二枚生吞下 用白狗乳汁酒服之 涅



欽定四庫全書 欠已日奉公告 一 嫌口中好言未然禍福至及其時毫髮無失人有起心 附着沉沉默默審言譫語誹謗罵詈訐點人事不避譏 惡是也由人精神不全心志多憂逐為邪鬼所擊或復 夫病者卒心腹脹滿吐利不利如乾霍亂状世所謂衝 普濟方卷二百五十四 雜治門 中惡附論 普濟方 明 周王朱橚 撰

看感人或復觸犯忌諱土地神靈為其所作非有真實 金岁口匠 其状萬端如醉如狂不可緊舉此皆神思及諸精魅附 已知其摩登高涉險如履平地或悲泣呻吟不欲見人 氣卒中之也夫人陰陽順理禁衛調平神守則强邪不 但隨方俗放驗治之中惡者是人精神衰弱為鬼邪之 干若将攝失宜精神衰弱便中鬼毒之氣其状卒然心 大而浮者死緊細而微者生又中惡吐血數升脉数細 腹刺痛悶亂欲死又凡卒中惡腹大而滿者診其脉緊

钦定四庫全書 | 疰也 者浮焱如疾者生中惡者差後餘勢尚滯發作則蘇 備急散一名雄黄版治卒中惡客怀五尸入腹鬼刺鬼 病 排及中蟲毒注吐血下血及心腹污痛腹滿寒熱毒 蘆谷一蜀秋去日并閉口野首二光花 酷妙巴豆 雄黄丽二丹砂丽 た二月五十番湾方 一附子一两一分 桂皮 教

辟穢丹 零光幻減半病在頭當鼻衂在膈上則吐在膈下則 器貯之家封勿巡氣遇急病水服一分許加至半錢 右将巴豆别治如脂餘細為散以巴豆合搖令气流 右為細末水丸如弹子大久害妙每烧一丸加扇香 利在四肢則汗出而愈 細辛科甘松两川芳丽 去心教 能群穢氣

桃皮湯此好治中惡喘急氣心腹痛胸肠脹滿短氣 大元司母 在 右除真珠外剉如麻豆每服五錢水一歲半入生舊 治卒死亦可酷灌之 右以猪脂如鷄子大苦酒一升煮沸以灌喉中又救 少許如無亦可 焙桂各二两附子腳一兩 吴茱萸炒半两切桂去粗皮附子脚双去皮吴茱萸为洗焙 桃皮引者白楊皮握栀子仁林四真珠研當歸 救卒中惡死及卒死 善所方

桃皮湯 當歸散忠方治中悉心腹痛胸肠短氣 金河山上石重 淬不時温服 右為散每服三錢水一盞入豉五十粒煎至六分去 無白楊皮 大養煎至一盛去澤內真珠末半錢攪勻温服 當歸二两則施子仁兩挑白皮而附子去皮 赤芍藥而连我茂而桂心而吴茱萸通烙乾微 治中惡心痛胸脇疗刺喘急 卷二百五十四 脐炮 方 銐 炒十

大足日年 公等 雄哉膏骨出肘後方療中惡暴百病 右以苦酒漬一宿猪胎五斤東南陳蘆煎五上五下 **薑半分切碎煎取七分去滓入丹砂末半錢温服** 右除丹砂外剉如麻豆匀每服五錢水一遠半入 雄黄而硃砂四當歸而椒兩鳥頭升雖白升 豉 挑東行白枝皮對 五炒 合各 两焙 桂 三去 兩 附子皮腳一两 吴茱萸 影浸焙 告述る 丹砂啊 栀子仁杜 當歸 香

朱砂丸出聖治中惡客忤垂死 紋去海内雄黃朱砂木機令相得畢諸卒百勞温潤 右細研令引煉蜜和搖三五百杵丸如麻子大每服 身中住 癰腫諸病瘡皆摩傅之夜行及病胃霧露皆以淮人 服如來核一枚不差更服得下即除四肢有病可原 為大大人 1 飛雨 巴豆可紙東屋去 過一雄黃水飛過麝香所分別附子 卷二百五日 油心 雨-

欠己の見とす 空青散惠方治中惡客忤垂死 朱犀散出經驗治中惡中怀鬼氣其證養夜或登厠或 出郊野或遊空屋或人所不至之地忽然眼見鬼物 候又用湯一合與酷相勻服之須則即吐為妙 右相和研今句每服酷一合相合調散半錢不計時 七九以利為度 不計時以粥飲下三九不利更服三九漸加至五九 空青一两麝香和研碎砂水飛過 雄黃細研 普派方

金河四月石書 桃枝湯此方 右為細末每服和与二錢用井花水調唯服如無前 麝香安息香蘇木樟木之類醒方可移歸 鳴心胸俱緩切勿移動即令人圍繞打鼓燒火或烧 出清血性命逡巡須更不救此證與尸厥同但腹不 鼻口吸着惡氣驀然倒地四肢厥冷两手握拳鼻口 件樂只用單方 犀角非兩鳑生麝香分大硃砂分 卷二百五十 m

欠足以其私 又方出た 雄黄九出智治思恩氣出鬼毛方 為灰每服二錢百沸湯點灌服 右用故汗衣或觸衣者着在上身多時久遭汗者住 雄黄只用後方 用觸衣者久着上身內衣也男用婦衣婦用男衣焼 右用雄黄為末每服 獨期赫人雄黃錢杏仁皮尖雙仁炒 Į 告所方 錢桃枝葉煎湯唯下如或無 ٠<u>٠</u>

金リロ 備急九一名追魂丹泰心腹卒暴百病中惡客忤心腹 右為細末以蜜為九如梧桐子大每服三九温水送 坐少時鬼毛自爪甲中間出矣當汗出即差 脹滿卒痛如錐刀刺氣急口噤風氣忤迷絕不知人 瓤為九及停尸卒死者以煖水服之若不下捧頭起 下不拘候服之一方為散研以水三合曜之亦可棗 都研為九如麻子大每日空心以粥飲下三九静 巴豆出的乾薑两二大黄西 Ĺ 欠已日月之十二 具茶更散患す治中惡心神煩悶腹脇刺痛宜服な匿 麝香散忠な治卒中惡心腹刺痛去惡氣 便愈若口已須噤亦當拆齒唯之藥入喉即差此藥 右為散拌匀每服二錢空心熱水調下日未再止更 無問一切雜病並能治之 灌令下喉須臾差未知更與三九腹當鳴轉即吐下 服亦可浆水調服 麝香矿一 犀角屑两木香两半 普齊万

備急散 金切じたろ言 雄黄散點於治卒中惡心腹巧痛刺急脹滿 生沉者死煮取三升時飲之 右以察水五升煮之以病人榔内其中三沸榔浮者 右為散取一 並根一推烏梅井四具菜更湯洗焙乾 大黄、在杜心两巴豆皮熬研 雄黄科赤小豆炒熟瓜帶 治卒中惡心痛脹滿欲吐短氣 錢以湯七合和服當吐下即愈 卷二百五十四

次定四年公告 又方出聖治中惡問亂腹痛心膈不利宜服吐 一神方 當小吐立不吐加至二錢 古無人参蘆頭 右搖碎以酒二升微煮之去滓頓服之取吐為度 右為散每服不計時以温浆水調服一錢服至錢坐 蒼木 桂心 能辟死氣 两宿焙乾 白术两甘草两二两米泔浸白术非 两生薑兩桅子粒 或合人参蘆頭河到 Į 告所方

又方金打 治中惡吐血欲死 金岁七五人里 治中惡出于 右為末每服二錢入鹽少許百沸湯點服 右用葱心黄刺鼻孔中血出愈肘後方云入七寸八 右用煮水蘇汁一斗服之 右用大豆二七粒為末雞子黄并酒相和頓服雞子 寸深若使目中血出住崔氏云男左女右

又方坐方 欠已日月上十 又方出方 又方坐方 伏龍肝散出于治中惡并盡毒 右宜温二斗猪肪顿服之 右冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐 右使人尿其面上可愈肘後云此扁鵲法 白亦可 普州方

又方出本 又方忠方 金岁山胆石量 治中惡氣欲絕忠聖 犀角散 右用臘月野狐腸焼灰以水服方寸餘 用車虹胎如雞子大温酒烊令熱服之 右用犀角矿為末和水服之 右用京墨為末水服一錢零 治卒中惡心痛及心胸煩悶熱毒筋骨中 卷二百五十四

大臣四年亡号 治中惡心氣欲絕思方 艾葉湯此聖治中惡道尸心腹及身體痛者甚短氣不 繁傅 語以手按之得其痛處則病人色動恐人近之宜义 熨斗着火熨义上 右取釜底墨半两鹽一錢和滓研入熟水一盡調服 泥餅令熟傳义上冷則易之不過再傳愈又一方以 右取生义小葉接碎傅痛上厚寸餘以沸湯和灰作 普濟方

治卒中惡氣絕出聖 又方出十便 金少四月八十十 吹也 煮之岩口不開抄口內藥也 右取新牛粪紋汁服無新者以乾者浸汁服乾者上 右取真硃砂書舌作思字額上以書之大良 力吹之塞口傍無令氣得出半日病人即噫則勿復 右仰卧以物塞两耳以竹筒内病人鼻中使两人用

又方後方 又方後方 救卒中惡死及卒死此时 火世四年全十二 右取雄鴨就死人口上斷其頭以熱血瀝口中升急 茅於器中焼之茅盡益之勿頓多也取愈乃止 右先以衣三重籍服上以銅器着衣上稍稍用少許 之宜並捧其肩上側身遠之莫臨死人上 右令二人以衣壅口吹其兩耳極則易又可以简吹 音濟方

金字口匠人 治卒暴 扁鹊陷米九独肘縣内脹病并鹽宜中惡等及蜂百毒 以竹筒吹其下部極則易人氣通下即活互吹之 右用鯉魚邁燒灰酒服方寸餘 溪毒射工 雄黄而真丹砂别研察石教 臼 枚七黎蘆大の杏仁 下 與此者失矣 班猫去翅龍膽炮七附子 卷二百五十 **尖皮熬** 四十枚去 vØ) 生磐石坑西半 鬼

中和湯就衛生治忽感惡氣閉昏問量倒逆冷氣絕卒 右搖篩蜜和搖干杵腹內脹滿病中惡邪氣飛尸遊 **亜蛇五色若蟲症病中惡邪飛尸遊走皆服二三九** 走皆服二九如小豆若積聚堅結服四九取利洩下 小及病脹輕重加減服之 摩漏上若蛇蜂百病若溪毒射工其服者視强弱大

钦定四車全書 関 右用香附子不拘多少為末每服二錢白湯調服心 中驚氣四肢厥冷

吾酒方

†

又方後方 救卒死或先病漏或常居寝即奄然而絕皆是中惡救 治破腹中惡血殺蟲 之方後方 右割丹雄雞冠血管吹內鼻中 右用馬鞭草生搖水煎去海盛煎如餡空心酒服 右破白犬以搨心上無白犬白雞亦佳 中痛醋湯下 卷二百五十四

治鬼氣注件中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常為鬼神 治中恶心痛出孫真人 治中惡及叛死或先病常居寝即奄然而絕 右以古機板用水酒和東引挑枝同煎服當得吐下 右用苦参一两酒一升半煮取八合乘熱頓服 匙後惡血皆下良 所崇焼者 右以韭搖汁灌鼻中一方用雄汁

大臣四年公告一

普濟方

1

辟惡氣以本 治心忽中惡口吐清水者其本 辟惡氣此本 金ないたんこ 右取兜納香焼之能辟遠近惡氣 亦强含嚥更加草豆蔻同為末煎湯常飲之佳 取彌古者住杉材寂良千歲通神 右取高良薑根如骰子塊含之嚥津逡巡即差若具 右以臘月鼠焼灰為末服一錢水調之佳 卷二百五十四

欠已日年七号 治惡氣脹消出本 治惡氣温中消食出本 去惡氣出本 治惡氣令人身香羹此本 右取椒碾以豆醬汁食之芳香好味 右以桃橛煮服之三載者良 右用白茅香煮服之亦可以作湯浴之 右取橙子瓤和鹽蜜細細食之 普濟方 나

祛鬼氣其本 治惡氣心痛其本 除邪辟惡出本 除身中一切惡氣不潔之疾令人白净肌體滑澤此本 金グレルろる言 右 用迷迭香焼之去鬼 右以土岩瓜酒煮服一合 右以天門冬煮食 右以麝香一劑安於抗合中枕之 卷二万五十四

治中惡注忤心腹痛此本 伏鬼物惡氣此本 治鬼氣中惡在忤心腹痛惡夢鬼神此本 大臣の事を皆一 惡出木 亦名為鬼針 右用糧咒中水進一合多飲令人心悶 右以腐竹根先入地者煮服之一名思齒先入地者 右以五月五日取棟葉佩之

治惡氣中惡心腹痛鬼在此本 金罗巴尼人 辟邪惡鬼出本 恶站本 右用磨石焼赤熱投酒中飲之 者晨飲酒病者食粥死者空腹凡酒勢辟惡勝於 右以火糟頭帶之 右以酒服之昔三人晨行一人健一 右以釣樟材用酒煮服之 卷二百五十四 病一人死健

改定四車全書 人 治中惡與卒死思擊亦相類為治皆参取而用之若己 治中惡鬼氣其本 治惡鬼神注刺痛霍亂出本 右搖菖蒲生絞汁灌之立差尸厥之病卒死脉猶動 食 右取厕籌燒取熱氣徹上 死者并用此本 右以茄子酒飲磨散服 告済方

治中惡心腹刺痛其本 治中惡脫肛其本 治中惡在忤此本 治中惡客忤垂死以本 右以年久筆頭焼灰水飲之 右用熱煖薑酒一挖服即止 右以麝香一錢重研和醋二合服之即差 又聽其耳中如語聲股問煖是也亦此方治之 超二至五十四


辟惡出本 次定四車至馬 辟邪惡氣出本 治惡病其本 惡山本 右用降真香令小兜帶之 右以琥珀带之 右以松葉陰乾搖為屑九服無不差 右以羊屎烧薰鼻中 普濟方

殺鬼去邪氣站本 治退氣站本 辟惡鬼出本 金はいたんご 右以丹砂带之 隅宿浸絞取汁温一沸三五日一度服 右取樗木根皮 右以桃木中蠹食之 右以虎爪懸小兜臂上 握細切以童兒小便二升政 卷二百五十四

次記四軍全馬 治鬼氣出本 療 辟邪惡去鬼氣此木 治百病一切惡氣疰病此本 右取初生艾實作乾菜食之 右取青蒿子為末酒服之方寸餘差 右以麝香研了以水服之 右以蘇合香俗云獅子屎赤黑色燒之 一切鬼氣其本 告所方

治鬼氣注忤出本 治鬼氣坐本 殺思毒出本 治鬼氣以本 金少したとこ 右用堇菜生取汁半升服即吐出一名薰葵 右取必栗香煮服之并烧為香 右以白蒿子末和酒服之良 右以枕材煮汁服之 卷二百五十四

治卒惡心腹不安 治心腹惡氣 治百惡氣 欠 日 早 全 雪 右取艾葉排汁飲之 能消一切冷血田野之人與此方相宜也 右取义子和乾薑搖作末蜜九如梧桐子大空心服 右以茴香並葉煮食之即差 三十九服以飯五三匙歷之再服其鬼神速走出頗



欽定四庫全書 一人 阿魏散 滿短氣不能食診其脉人迎氣口乍大乍小乃思魅所 言驚怖向壁悲啼夢抹多魔與鬼交通病作寒作熱腹 持之候也 起箭羽 駒駝牛等毛如泥如死人胸骨一两矣阿魏縣四 野孤鼻好彩鼻好放頭骨人具雄黄 方 治夢與鬼神交通及狐狸精魁等方 露蜂房 普濟方 此二万五十四 白术 虎頭骨人兩 驢馬 腽肭臍

雄黄散 忽悲恐怖如有鬼物皆發於大驚及當風從高墜下 子大以煎患者欲薰之時蓋覆衣破物令藥煙洩別 指雄黄為末以籍樂焼樂節度一如薰香法其樂 分於採下薰彌善忌挑李雀內等 **推節為散攬使調与又先以水煮松脂候焊接取** 和散和散之時勿以手攬将虎爪攪和為九如弹 炙 治五臟六腑氣少亡魂失魄五臟不安忽喜

九精九 火定四年在 石羅為散每服不計時以温酒調下一錢日三服不 方有生地黄二分一方有蜀椒五分乾薑四分 治稍增至二錢服廳劣者更加人參五分十分合 落水所致悉治之 茱萸麻麻黄根節 人参廣頭 清黃分 微炒黄者對 桂心科細辛科黄環科澤寫科山 雄黄細研黄芩母黄連三分黄葉 治感鬼鬼邪氣驚怖悲啼休作無時一名九 告濟方 分川大黄两

黄環九 金はロドイコー 物牛黄丸 右為末塞九如小豆大每服一九食前温酒下日二 以知為度 牛黄研荆實 黄環西琥珀研二丹砂研生銀水磨龍膽私二白 石脂矿元参 頭 蚯蚓做元参公大黄炒問站各 治邪氣鬼魅脉見人迎氣口時大時小 龍骨两二 曾青研五屑研雄黄研空青研赤 卷二百五十四

次定四車全書 一門 煞鬼五邪丸 右除研者外搖羅為細末入雄黃丹砂再研拌匀鎔 蠟和九如弹子大棗盛之男左女右擊於臂上小兒 右為細末酒煮麵糊和九如菜豆大雞鳴及日中時 用温麝香酒下十九稍加至二十九以知為度 箭羽去姓二桃仁多浸去皮尖雙芫青三十枚 丹砂研雄黄研龍骨 治邪氣鬼鬼所持妄言狂走恍惚不識 普濟方 鬼臼妖毛赤小豆两半 主 鬼 炒

大殺鬼九 繁於頭合樂時勿令婦人雞犬見亦可用蜜和為九 右羅為末煉蜜和九如杏核大伏屍惡疰為患者焼 可馬目毒公可外堂秘要有 如梧桐子大每服一九米飲下日三方用犀角屑亦 九安室四角熱疾時氣燒一九安床頭邊牛馬疫 **虎頭骨馬雄貨細研鬼臼去鬚天雄去腳皂炭** 一两燕夷而黎蘆蘆頭及子燕夷一兩去 絕一切鬼魅魍魉 卷二百五十


虎爪九 大田田田 1 四物寫頭散 桐子每至正旦及有孤魅處焚之甚妙以薰巫人即 右除研者外為細木再入研者拌勻鎔蠟為九如梧 神去一方無蟹爪用蟹爪消松脂和九如芡實大堂 疾烧一九安鼻中 鹿爪焼三丹砂饰無朱雄黄細蟹爪焼各 治狂邪鬼鬼妄語狂走恍惚不識人鬼名殺 治鬼魅 告所方

金ないたる言 又方 右藥搖篩以酒服方寸匙欲病見思增防葵一分欲 右為散早以井花水服方寸匙日三服 令知鬼主者復增一分看驗防葵莨菪並令人迷或 恍惚如狂不可多服 東海萬頭提椒黄牙石紅名防葵谷一莨若子分 雄黄两人参西防風而五味子小 并出曝炒今黄色水 削去浮者水煮令 治女人與鬼物交通獨言笑或悲思恍惚 卷二百五十


次定四軍全書 一 鹿角散 治精避感着語言狂亂悲怖不常不飲食 右用虎爪攪令調如弹子九一夜內籠中燒之令女 裸坐籠上被急自家唯出頭耳過三薰即斷 右用鹿角鳑屑狼羅為細末水服方寸匙自言則差 又一方用酒調服三服 松脂烂雨雄黄雨 治妖魅病人不言思若男女喜夢鬼通致恍惚 孟

雄黄散 辟諸邪祟附着及小児驚哭恐悸 治百邪鬼鬼 右用水銀一兩入浆水一蓋炭火上煎取三分方去 火取生水銀如豌豆大空服一九晚再服一九一日 右用雄黄研如粉吹入病人兩鼻中差桂亦住 右於安息處取一皂子焚燒今煙起邪自去 三作神符暴生水銀空腹吞之 治鬼迷不寤及卒魔

欠日の下にす 治鬼魅傳尸温疫魍魎神等 辟百邪鬼魅 原癲狂思點及盛毒等 右用鵲巢多年者焼之亦傳癢瘡良 右取古風水以太歲所在日時當户焼薰之 右用水服獅肝末日三千金異用獺內末 右服頭垢如小豆大 治鬼魅 告所方 荳



次巴印華白馬一 治狐魅 治人 治精魁那氣 右以鷹嘴及爪焼灰為末和飲服之 右以桃符煮汁飲之亦以桃雙九散服之亦以桃仁 更多睡其面即活以菖蒲末吹雨鼻中又桂末吹舌 右勿以火照照之殺人但痛齧其踵及足拇指甲際 入卧忽不客 告濟方



鎮心丸 湯也 至於死又人魔須遠呼不得近而急喚恐神蒐或致飛 無忌若在夜暗處魔者忌火照火照則思蒐不復入乃 欠 巴印 戶 白 方術治之乃蘇若在燈光前魔者是魔本由明出喚之 飛荡去離形幹故魔不得落以致死必須人助喚弁以 紫石英两二丹砂两一雄黄 两白茯苓皮黑茯神 治心氣怯弱常多魔夢恍惚認忘 吾所方

金安正正人言 大定心渴 右為末煉蜜為九梧桐子大每服十九食後以熟水 下日三增之 杜銀屑 乾薑 **鉄青兩一細辛去苗葉** 法甘草矣判各防風張蘆防己 當歸 茯苓 治心虚悸恍惚多忘或審驚魔志少不足 菖蒲 茯神 甘草多白木 桔梗豉爐人參 卷二百五十四 遠志法赤石脂 ち楽 當歸始桂去粗 乾養炮遠志 大寨 龍骨

次定四年全等 一門 不足 參散 無好治心氣 虚悸恍惚多忘或夢客驚魔B 右切以水一斗二升煮取三升半分為五服日三夜 忌如常法 黄 判 當歸妙 甘草系微白木 人參 職 廣 徒神 防風 桂心 紫苑两二 防風去蘆紫苑去苗土己 普済方 遠志法赤石脂 白ち楽 龍骨 乾薑 熟地


徒神散出聖治虚蘇心氣乏弱多魔 八毒亦九此降生治男子婦人染者神鬼謂之鬼疾病 時温服 右搗為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計 **滓不計時温服日三** 右搖為散每服四錢水一中蓋入賽三枚煎六分去 茯神而黃者如兩甘草做私對白芍藥一乾蓝 判 遠志去心人參蘆頭 桂心雨地製 卷二百五十四 兩

次軍四華公告 脉乍大下小乍短乍長氣血不勻邪氣傷正本官說 右為細末煉塞為九如小豆大每服五七九至十九 於脇下打了一拳遂一點痛往來不止寒熱不食乃 去路到邯鄲驛中夜夢一婦人看青衣不見面用手 冷水送下無時昔入國副使許可道致雄州請醫看 服之甚有效験 増石 巴豆兩 蜈蚣 雄黄 朱砂 普齊方 牡丹皮 附子炮藜蘆

小定心湯 金岁里屋台書 清水二斗立效可謂如神合時宜齊戒心志 右剉如麻豆大每服五錢水一盞入棗三枚擘煎至 鬼擊也可服八毒亦九本官言普讀明醫録中看李 子愈八毒赤凡為殺鬼枚子遂與樂三粒卧服旦下 桂去粗皮 茯神去木甘草 野芍藥 分去滓温服日三川芳無甘草 治形體虚贏心氣怯弱多魘善忘 卷二百五十 乾薑炮遠志法人參 四

次包甲公馬 一 雄硃散出衛生或到客舎官驛及父無人居冷房睡中 伏龍肝散此并治鬼魔不客 兩鼻中 右為末每挑一錢床下烧一錢用酒調灌之 為鬼物所魔旦間其人呃呃作聲便令人呼喚如不 右用伏龍肝為末吹鼻中或以桂心末以蘆管吹 醒此乃思魔也不急救則死 牛黄錢雄黄錢大硃砂鲜 普派方 季

治卒魔此十便 雄黄散出聖治卒隱 金岁以此人日書 麝香散此十便察卒魔 凡人好魔出本 右用虎頭為桃一方麝香一分又灌香少許 末佳 右用雄黄為末細篩以管吹入鼻孔中一方加桂心 右以桃仁教去皮尖三七枚以小便下之 卷二百五十四



群魔出す 金与いたとう 又方點好治卧忽不落勿以火照殺人但漏嚙拇指甲 常云男左女右帶之一帶頭上尤妙 起死迎生海縣方 有燈即存如無燈切不可用燈照 際而唾其面則活如不醒者移動處此子徐與之若 右用雄黄如棗大緊在腋下令人終身不魘張文仲 右取捣韭汁吹鼻孔中及灌两耳如冬月用韭根 卷二百五十

又方此經驗 次之四年全等 一 又方良放經驗 治卒魔無聖 右用竈心土槌碎為末每服二錢新汲井花水調灌 右用桃柳枝東邊者各七寸煎湯三蓋候温并灌服 之更挑半指甲吹入鼻中 其汁灌之口中秆兩鼻孔 右以菖蒲吹雨鼻中以挂末内於舌上亦得 香河方 Ī

破棺散一名複生散治魔家卒死及為墙壁竹木所魔 半天河 治卒魔世女 蟾妄語勿令知之與飮差 治自縊死一切横死心温弁用之 水渦金瘡卒致悶絕産婦惡血衝心諸暴絕證又無 右取竹雞頭水及髙樹穴中盛天南能殺鬼精恍惚 右法剔取左角髮方寸焼末酒和灌令入喉立起 卷二百五十四 欠ED早上tha T 治魔及惡夢出聖 治卒魔不審思理 ス方 中再割雄雞冠取血以管吹喉咽大良 右月生薑汁調蘇香丸灌之效 豆許吹入鼻中即活但心頭温者一日可活 右用半夏湯洗七次去滑不拘多少為末每用一大 右以蘆管吹两耳开其人頭髮二七垫作絕內鼻孔 治心下温一日可活 普濟方 ゴモ

治卒魔死此十便 又方 治卒魘不痞 金贝四四石書 當自寤 右卒魘之人多語聲不出不必髙叶但敲卧床其人 右用麝香不拘多少安頭邊住又灌香少許在口中 右以井底泥遲死人日令垂頭就井呼姓名即活 右勿以火照但痛齧其足後跟及足大指爪甲即活 卷二百五十四

又方後方 次已日戶 · 又方後方 魔不覺及凡人喜魔及恶夢者彼时 若遇其踵不覺者宜用势石散方見思擊門又方以 右取火燒死者火着枕中履中合枕即止 食鹽湯灌之 右以牛蹄或馬蹄臨魔人上亦可治卒死青牛尤佳 右以瓦甑覆病人面上使人疾打破甑則容 告濟方 盂

治卒應夢宋不祥 治氣死或魔死者後方 治卒魔昏不覺我財 金与巴人 魔籍出財 右指两手中指甲內即 右以華毛刺兩鼻中男左女右展轉即起也 右以真亦罽方一尺以枕之 石将霹靂石作枕並無此忠 白量 卷二百五十 醒

導引法出十便 次已日戶公方 · 着四小指内抱之積習不止眠時亦不復開令人 養生方云拘鬼門制鬼户名曰握固法屈大拇指 精神弱者魔則久不得悟乃至氣暴絕所以預旁 魔不悟候人服睡則魂魄外遊為鬼邪所魔屈其 不思魔魅又云人魔勿燃明喚之魔死宜閣喚之 好唯得遠與不可相近而急喚亦恐失魂魄也又 助與並以方術療之即蘇也 告所方 Ī

之剩今巫親實見忽被神思所擊刺擺撰者或犯其形 **胃脇腹消急痛不可按抑或即吐血或衂或下血輕者** 氣易襲故邂逅思邪相遇則為思擊之病一方鬼排言 或獲免重者或至不救治宜符禁之法無以辟邪安正 鬼排獨於人也其得之無漸卒者人如矛戟所傷令人 伍或遇相觸突或精神散弱或怨貧所招輕者獲免重 夫精全則神王精耗則神衰精神耗衰血氣虚弱則邪 思擊附論 卷二月五十四

金河四川至書

恩石散 大皇日年在馬一里 瓜蒂散 者多死猶如周宣燕簡董事不為虚也必應死者亦不 可瘵要自不得救之耳 右為末如大豆大以竹筒吹入鼻中得嚏則氣通便 活若未嚏復吹之以嚏為度 麝香 皂炭去皮雄黄細藜蘆玉蘆瓜蒂已上各 力 治鬼氣排擊心腹刺漏吐下血死不知及卧 治鬼排鬼刺下血 告済万 表六


升麻散 金岁巴尼石量 抑或即吐血或界中出血或下血 生磐石三斤烧两炊火取出去赤土于意方人名名名公散 魔齧踵不覺者諸惡毒病此是漢文帝時太倉令淳 右為散以竹筒吹大豆許入鼻中得嚏則氣通氣通 即活未嚏者復吹之又一方加丹砂麝香各半分 治卒得鬼擊如刀刺骨脇腹內急痛不可按 獨活勁 柱各半两 卷二百五十四

火軍四年全等 又方 治卒鬼擊如中箭忽然一點痛如疰不可忍 微徹 **踵後足拇指甲際而多唾其面即活** 右為散每服一錢溫酒調下一方去挂加犀角屑半 兩又方去獨活加大黄半兩 上緊搓斬艾一團似胡桃大安匙頭上炙之須臾痛 右以桃皮一片将裏面濕處貼痛上匙頭安桃枝皮 治鬼擊忽然不審若火照之則殺人但痛嗌其 普濟方

治鬼擊病 右酒七升煮取三升熟服須更發汗若不汗熨汗盛 脇腹内絞急切痛不可抑按即吐血或鼻中血出或 下血名思排 右以犀角枕住或以青木香内鼻中并带亦辟魔寐 大灸两脇下使熱汗出愈 雜煮白熟青花麻把 治鬼擊之病得之無漸卒着人如刀剌肚胃肠 思擊之病得之無漸卒若人如刀刺肚骨 卷二百五十四 钦定四軍全書 1 治鬼擊之病得之無漸卒着如刀刺状貿脇腹內絞急 治思擊之病及兵刀所傷血滿腹中不出煩懣欲絕卒 中惡 鬼排 切痛不可抑按而吐血衂血下血一名鬼排亦治卒 右以雄黄粉酒服一中盡日三血化為水 右以熟义與雞子三枚水五升煎取三升頓服之 **疞剌疼痛不可抑按或即吐血鼻中出血** 普濟方 兲

治卒中思擊及救卒死或先病或常居寝奄忽而絕皆 ス
方 是中惡 右斷白犬頭熱水一升飲之無白犬白雞亦佳 稍冷即棄於道傍得烏雞住 右以雞冠血瀝口中令人下咽破及此雞以搨心下 合煮沸灌喉中良 以猪脂取雞子大服未差再服亦可一方以酯 卷二百五十

又方 スす 又方 处巴日直 八十 右用犢子屎半蓋酒三升煮之服治霍亂大牛亦可 内於喉中 右用焼鼠大如黍米許水和服不能以水飲和少許 右以刀鞘三寸焼末水飲之 治鬼撃 治鬼擊 普濟方 麦



治夢中被殺刺或杖打諸般不祥卒然衂血吐血及 治鬼打鬼注邪氣 欠已日月 公子 右為末熟水日三服 血甚者九竅皆有病名鬼擊亦名鬼排 右銀鎚下鐵屑水漬攪沫出澄清去浑及暖飲三盞 右用蓬莪术酒研服一盏 升麻 卒忤附論 獨活 地黄 昔所方 續断各半桂一

譽石九點对治卒中件 **曾或悶絕不識人內色變異腑脏虚竭者不即治乃至** 是鬼厲毒氣中惡之類也人有魂魄衰弱則為鬼氣取 金为四周台書 於死然其毒氣有輕重者微治而差重者兒臟腑雖當 夫卒忤者亦名客忤謂邪客之氣卒忤犯人精神也此 時救縣餘氣停滯久後猶乃變成在也 犯忤喜於道問門外得之其状心腹疙痛腹湍氣衝心 卷二百五十四

正氣散 或氣悶又刺此思點之氣 右為末入研了藥令匀煉塞和搖三百杵九如小豆 大每服不計時以温酒下一九日二服蛇蜂蝎所中 以藥摩之效 孙巴豆 無 麝香細研犀角屑兩細辛分班猪做黄去翅足 磐石煨焼細研門子去皮腳 在黄細研真你再 療客忤心腹絞痛脹滿氣衝心骨煩躁壮 聚壓去油 藜蘆崖頭 蚂虫矣去 普濟方 平 足微

太乙神精丹坐行治客忤霍亂腹脹滿痛尸疰惡風癫 金切口因自言 右為末蜜為九如梧桐子大服十九日三温酒下 右各搖篩惟丹砂雌黄雄黃川職酷浸之自青好酒 狂鬼語盤毒妖魅温霍几一切惡毒並皆治之 各於鍋器中漬以紙密封記日中縣百日經夏急五 Ð 丹砂 麝香纸茯神 亦得無日以大暖之然後各研今如細粉以職階 鲁青 雌黄 人参 卷二百五十 磁石唇四合 天門冬法鬼臼 Œ 金牙二两 菖浦等

火巨四年上午 一 乾後安鉄環施脚髙一尺五寸置釜上漸放火無軟 色者次一色者下雖無五色但色光明皎潔如雪取 其過三上熟火已外皆須加火漸多乃至一伙時其 極冷然後出之其藥精飛化凝若釜上五色者上三 火已欲近釜即便滿就釜下益炭經兩度即罷火盡 分二分畫即溢如此三度畫用熟火然後用益生炭 硬炭等皆得初放火取熟一两秤炭各長置釜上三 同拌使乾濕得所內土釜中以六泥固濟勿今泄氣 香酒方 坐

金りい **黄雌黄各二斤丹砂以大酢瓷器中漬曾青美酒漬** 或少不足研如来膏九如黍粒一本云丹砂自青雄 住若飛上不盡更冷與火如前以雄雞異掃取或多 丹砂以甘土泥塗勿今餘毫毛許乾以剛炭火焼之 浥然内藥土金中以雄黄在下次下雌黄次自青次 去油膩記更搖数干杵皆勿研之別以大酢拌今浥 紙家封閉日曝一百日雄黄雌黄各油煎九日九夜 九日九夜去釜五寸九日九夜至釜底九日九夜侵 1:1 卷二百 £,

膏和一切丹不得用蜜皆用棗膏學者宜知舊不用 釜中際刮著一匝開之取丹丹成記細研如粉以棗 病黄久百方不差又加心腹脹滿上氣身面脚等並 釜腹三寸三九二十七日冷之一日一夜以刀子於 磁石金牙今加而用之治偏風大風惡疾癲癇歷獅 不差者更服一九半仍不差者後日増半九漸服無 腫垂死者服一九吐即差亦有不吐差者若不吐復 **鬼打等最良服法平旦空服一九如黍米為度其霍**

次定四年之后一

金はならんとう 有不差氣亦定當吐出青黄白物其因種两脇有癖 塊者亦當消除若心腹不脹滿者可與一九日日加 致浆粥任意食之若病曆盗汗虚弱者日服一九至 水便即下者忽恠若患霍日近精神健亦可斟酌病 亦可三日 二日吐即止若患種不汗氣復不流脚冷者服一 之以知為度不必專須吐亦可一九即差勿併與服 人樂性併與两九作一九頓服之皆午後食勿使熱 服皆須以意斟酌量得其宜或腹內有 卷二百 五十四

钦定四軍全書 吐差者亦有服少許而差者亦有殺藥强人服三四 至三日若不汗氣復脚即暖有閏汗不止三日吐即 床羸瘦并腹脹滿及腫或下利垂死者與樂救之亦 泰米大服之為始漸加以知為度樂力驗壮勿併多 止若患瘡無顏色者服藥後三日即有顏色亦有須 或差也又一說癥瘕積聚服刀圭以飲浆水送下治 九始覺樂行者凡人禀性不同不可一縣與之但作 服特慎油麪魚肉蒜當清净服之若有患久不差在 告所方

大病相易死亡滅門癲狂思語已死氣絕心上微暖 諸卒死中惡客忤霍亂腹滿體帶五尸注惡風沒悴 者扶起頭以物擊口開琢去两齒以浆飲送樂樂下 可以苦酒和之塗方寸紙上著兒心腹上令藥在上 左女右小兒擊頭上降瘴毒氣惡時氣射工小兒忠 者不過再服亦有不汗而差復有不汗不愈者服如 即活諸久病者日服一刀主覆今汗汗出即愈不愈 上法加半刀圭以差為度常以絳棗帶九刀圭散男 卷二百五十四

必令人吐逆下利過此即自定其樂如小豆大為始 **煮肥猪內食服此樂後小應頭痛身熱一二日来大** 治之亦有已死者冬二日夏一日與此樂同服得樂 **鄉諸惡風癩病等亦可二十服自餘諸惡病者皆止** 從此漸小不得更大大風惡亂癩可二十服偏風歷 便下活若不得入腹不活若加金牙石者至五服内 不能得食味後自漸得氣味五日後更能食若貪食 二服量人輕重强弱不得多與若欲解殺藥但爛

大巴の町在島

普濟方

置

作土釜法 金切口及白電 為一刀圭 過多者宜節之若服藥下悶亂可煮木防己湯服之 即定凡言刀圭者以六粟為一刀圭一詵云三小豆 乾又法作一瓦釜作一熟鉄釜各受九升瓦在上 鉄在下其状大小隨樂多少不必依此說一本云 **擅好甘土絹節水和作泥硬軟如坯瓦泥泥一** 取兩齒瓦盆各受二大丰許以甘土塗其內令極 卷二百五十四

飲定四車全書 節其石釜六一泥及鉄釜皆除之勿更用也此釜 土及待冷一日一夜乃取掃拭令净以黄丹醋和 五升內釜糖中四向土撊擁之令糖禍釜周回上 内細紙擔可受十斤亦可随樂多少作之陰乾三 招魂太清神諸大丹皆用作釜作之萬成終不落 如稀粥掃其中令厚一分乃内藥九合九丹八石 下各厚七寸以火從下放五日五夜勿今人近之 日置日中縣亦三十日多飛轉向日乾花以糖 告濟方 累

作六一泥法 右取職醋以足為度若無鹵以鹽代之先作甘土泥 以泥各别暴前黄蓉等五種作图表之勿令泄氣以 赤石脂 余欲令當来天下學士得解之所以委曲具述之 也 國土 己上各 具前後数十四用不動久久轉此法師甚秘之 牡蠣 滑石 卷二百五十 礜石 黄礬 蚯蚓屎

大江日日 江西 自青如蚯蚓屎如黄連加即住世少此看好崑崙碌 酢可用二分酢一分水和用取煎瓦盒以此泥塗之 節然後與蚯蚓屎鹵土等分以酢和之如稠粥既得 者宜須合此一篇皆以王相日天氣晴明齊戒沐浴 火燒周三日最好一日亦得出破團取藥各狼碎絹 如法合之 亦得差病丹砂亦堪硃砂亦得舊不用磁石金石今 加之用治萬病惡風神良九有患年運積歲不可治 述日古之仙者以此教俗特為至秘余 普濟方 四十七

還魂散一名還魂湯治卒感忤思擊飛尸諸奄忽氣絕 識今須識者随其大小作蚯蚓屎者即是如此干金 論宿癥風氣百日服者皆得痊愈故叙而述馬 中却得雄黄大賤又於雅鳥玄武大獲曾青蜀人不 以大業年中数以合和而苦雄黃魯青難得後於蜀 勿生用丹必熟毒不堪服宜慎之 凡雄黄皆以油煎九日九夜乃可入丹不爾有毒慎 可求遂於蜀縣魏家合盛一金以之治病神驗不必 といって 卷二百五十四

次定四車至書 · 持梗散 些 对治卒客件不能言 立效 無復覺知或已死口噤即發口下湯湯入口不下者 捉病人髮左右搖動引之樂下復能取盡一升須臾 服一方無丹砂 右搖為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓分二 ^排丹砂科 麻黄根前各仁皮尖製仁焙桂心兩甘草炙微麻黄三兩去杏仁三兩浸泡去桂心三十十一两 普濟方

桔梗散出附治卒件停屍不能言 細辛散後前治卒件停尸不能言 附子散此时治卒件口味不開者停屍不能言 右研与每服以温水調下二錢服之 右為細末內口中 右焼桔梗二枚末米飲服之仍吞麝香如大豆許住 桔梗末和麝香 細辛 桂心谷等 卷二百五十四 大きの野とす 又方 又方 麝香散性材治客忤惡氣垂死 立愈 皆恭通 右用麝香一錢重研和醋二合服之即差 右用鹽八合以水三升煮取一升半分二服吐之即 右用生附子置管中吹内舌下一方搖末吹喉中 治卒件所謂中惡者與卒死思擊亦相類為治 普濟方 學九

金分口居白書 スオ 治客忤者中惡之類多於道路在外得之令人心腹紋 治卒中客件死後加 將熱湯於肚上轉移温之湯冷別換 右用好京墨為末調二錢服或瓦器盛湯用衣觀貼 痛脹滿氣衝心 門不急治即殺人此經驗 右用真丹砂方寸餘蜜三合和服口噤者折齒下之 如若小便不通筆頭七枚燒作灰末水服之即通 卷二百五十四

次足四車全書 夏 客忤者中惡之類也多於道問門外得之令人心腹絞 治卒仵停尸不能言者沒朋 枚差 右以銅器若瓦器貯熱湯器看腹上轉冷者撤去衣 痛脹滿氣衝心貿不即治亦殺人此急救之方徙方 右用真硃末以雞冠血和九如小豆大內口中三四 右用人血和真硃如梧桐子大二九折齒内喉中令 普濟方

金なせんと 普濟方卷二百五十四 服器親內大冷者易以熱湯取愈則止